



INFOS santé

PAR F. ARNOLD RICHEZ
ET E. CHANTEPE

Autisme : une campagne pour mieux le repérer

A l'occasion de la 2^e Journée mondiale de l'Autisme, deux associations(*) ont lancé une campagne grand public en faveur du dépistage précoce de ce trouble envahissant du développement.

● **1 enfant sur 150.** Pour en donner le signal de départ, elles ont commandé à Opinion Way une "étude miroir" auprès des Français et des médecins. Résultat : ce trouble sévère est très sous-évalué, même par les médecins, puisque 64 % pensent qu'il touche 1 enfant sur 1 500, alors qu'il concerne 1 enfant sur 150. Conséquence : même s'il est acquis qu'il peut être repéré entre 2 et 3 ans, le diagnostic reste souvent tardif. C'est une perte de chances pour l'enfant, dont la plasticité cérébrale est capable de combler en partie des déficiences. A condition de bénéficier à temps de programmes adaptés.

● **Pour le diagnostiquer plus vite.** La première étape peut être gagnée par les parents s'ils savent en reconnaître les signes. Et en parler au médecin. Exemples : écholalies, retard de langage, indifférence, ou hyper-réaction aux stimuli sonores, difficultés à accrocher le regard, comportements répétitifs...

● **Des structures éducatives nouvelles.** Aujourd'hui, 23 structures expérimentales mettant en œuvre les méthodes dites comportementalistes (type ABA ou TEACCH), jusque-là décriées en France, ont été autorisées et seront ouvertes en juillet. A quelques mois de la clôture du 2^e Plan Autisme (2008-2010), plus de la moitié des places en établissements promises pour 2012 ont déjà été ouvertes. Enfin, trois dispositifs d'accompagnement à l'annonce du diagnostic ont vu le jour (Paris, Tours, Strasbourg).

(*) Autisme France et Autistes Sans Frontières, www.autisme-france.org et www.autistesansfrontieres.com

Etats-Unis : le prix des ovocytes flambe
Les tarifs des donatrices d'ovocytes sont désormais cotés en fonction des diplômes. Une étudiante de l'université de Harvard peut ainsi négocier son ovocyte à 35 000 \$! Georgia Institute of Technology

Ni écoles ni crèches près de lignes à très haute tension, vient de recommander, par prudence, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET).



Mal des transports : une nouvelle Cocculine

Ce grand classique homéopathique utilisé pour prévenir et soulager les symptômes du mal des transports fait peau neuve pour s'adapter aux enfants de 18 mois à 6 ans : il est désormais disponible sous la forme de comprimés qui fondent dans la bouche en quelques secondes (orodispersibles). Par prudence, pour éviter tout risque, désormais mineur, de fausse route : faire dissoudre le comprimé dans un peu d'eau. 5,70 € la boîte de 40 comprimés, Lab. Boiron.

L'obésité maternelle menace le cœur du fœtus

Plus une femme est obèse lorsqu'elle conçoit un enfant, plus celui-ci risque d'être porteur d'une malformation cardiaque. L'étude récente des Instituts nationaux de la santé américains (NIH) portant sur 1 530 000 naissances pendant onze ans vient d'évaluer la majoration de ce risque à 15 %. Il ne concerne pas les bébés des mamans simplement en surpoids. *American Journal of Clinical Nutrition*, 7 avril 2010

Baby-blues après une adoption aussi

Une étude américaine récente vient de démontrer que les mères adoptives connaissent elles aussi cette mini-déprime. Plus que le facteur hormonal, c'est donc le grand bouleversement provoqué par l'arrivée de l'enfant qui serait en cause.

Western Journal of Nursing Research, déc. 2009